

Siebenschläfer

Glis glis

Baumarten

Bergahorn, Spitzahorn, Buche, Lärche

Baumarten (lat.)

Acer pseudoplatanus, Acer platanoides, Fagus silvatica, Larix decidua

Symptome

Rinde von Bäumen im Stangenholzalter in Höhen von 2-10 m plätzweise entfernt. Zahnzüge in weichem Laubholz sichtbar. Doppelzahnspur 2-2.5 mm breit. Benagt wird fast ausschliesslich der Stamm und weniger die Äste.

Ursache, Zusammenhang

Siebenschläfer entfernen die Rinde um an den Saft der Bäume zu gelangen. Jahre mit sehr hoher Poulationsdichte treten in artenreichen Mischwäldern ca. alle 4 Jahre auf. Wo eine Baumart dominiert (Eiche, Buche) sind die Massenvermehrung von Mastjahren dieser Baumart abhängig.

Verwechslungsmöglichkeit

Gartenschläfer, Eichhörnchen, Rötelmaus, [Hornisse](#)

Gegenmassnahmen

Die Schläfer benagen die gleichen Stämme wiederholt. Geschädigte Bäume sind deshalb stehen zu lassen. Dadurch erhöht sich die Chance, dass andere Bäume unversehrt bleiben.

Bermerkungen



Siebenschläfer (Foto R.-P. Bille)



Von Siebenschläfer benagter Buchenstamm



Im Splint eines Ahorns abgezeichnete Zahnzüge