

Campagnol roussâtre

Clethrionomys glareolus

Espèces ligneuses

Hêtre, mélèze, épicéa, douglas, pins, arôle, tilleul

Espèces ligneuses (en latin)

Fagus sylvatica, *Larix decidua*, *Picea abies*, *Pseudotsuga menziesii*, *Pinus sylvestris*, *Pinus cembra*, *Tilia* sp.

Éléments de diagnostic

Grandes parties d'écorce détachées sur le tronc et les branches. Les rameaux fins sont aussi écorcés. Dommages perpétrés jusqu'à 8 m de haut. Traces de rongement dans l'aubier. Marques de dents formant une double fissure de 1,5 à 2 mm de large. En cas de forte attaque, houppier dépérissant.

Causes et conséquences

Multiplication massive. Elle se produit de manière cyclique mais à des intervalles de temps irréguliers. Les reboisements non abrités par un couvert sont particulièrement exposés à ce danger surtout s'ils se trouvent sur un épais tapis herbacé ou dans un milieu pauvre en végétation.

Risques de confusion

Campagnol agreste, loir, écureuil, [frelon](#).

Lutte

Renoncer aux coupes rases. Utiliser des bois tendres dans les plantations préparatoires. Badigeonner les arbres d'une couche de peinture protectrice. Favoriser les ennemis naturels comme les oiseaux de proie, le renard et la martre.

Remarques



Campagnol roussâtre



Verticille d'un mélèze rongé par un campagnol roussâtre



Mélèze victime des rongements du campagnol roussâtre