

Chamois

Rupicapra rupicapra

Espèces ligneuses

Sapins, sorbier des oiseleurs, érable sycomore, mélèze, épicéa

Espèces ligneuses (en latin)

Abies alba, Sorbus aucuparia, Acer pseudoplatanus, Larix decidua, Picea abies

Éléments de diagnostic

Manque de jeunes arbres, proportion réduite de certains arbres dans la forêt mixte, retard à la croissance de jeunes arbres aux couronnes embroussaillées, pousses sectionnées jusqu'à 1,5 m de hauteur. Parties sectionnées effrangées.

Causes et conséquences

Acquisition par les chamois de plantes nourricières. Disproportion entre le besoin de pâture et les quantités offertes. Concentration d'un grand nombre d'animaux dans un espace réduit à cause de l'étiollement de leur habitat. Trop forte augmentation de l'effectif des cheptels.

Risques de confusion

Abrouissement perpétré par le chevreuil, le cerf et le bouquetin.

Lutte

Gestion des habitats, promotion des prédateurs (lynx, loup), régulation cynégétique du cheptel de chamois.

Remarques



Chamois



Epicéa abrouiti par le chamois



Retard à la croissance d'épicéas abrutis par rapport à ceux qui en sont épargnés (dans l'enclos).