

Loir

Glis glis

Espèces ligneuses

Erable de montagne, érable plane, hêtre, mélèze

Espèces ligneuses (en latin)

Acer pseudoplatanus, Acer platanoides, Fagus silvatica, Larix decidua

Éléments de diagnostic

Ecorce des arbres, jusqu'à l'âge des perchis, arrachée sur sur longueur de 2 à 10 m. Coups de dents visibles dans le bois tendre des feuillus. Doubles traces de dents de 2 à 2,5 cm de large. Le loir n'écorce généralement que les troncs; il s'attaque moins souvent aux branches.

Causes et conséquences

Le loir arrache l'écorce pour accéder à la sève de l'arbre. Lorsque la densité de la population est élevée, c'est-à-dire tous les 4 ans environ, ces dommages s'observent dans les forêts mélangées et riches en espèces. Dans les lieux où une essence domine (le chêne ou le hêtre), le loir tend à proliférer lorsque celle-ci produit une paisson pleine.

Risques de confusion

Lérot, écureuil, campagnol roussâtre, [frelon](#)

Lutte

Le loir s'attaque plusieurs fois aux mêmes troncs. Il convient donc de laisser sur pied les arbres endommagés. Cela augmente les chances que les autres arbres en soient épargnés.

Remarques



Loir (photo R.-P. Bille)



Tronc de hêtre écorcé par le loir



Coups de dents dans l'aubier d'un érable